



2026

TAVASZI FAJTAAJÁNLAT

ISTERRA

TARTALOMJEGYZÉK



SZÓJA

SZÓJA AGROTECHNIKA	3
SU ADEMIRA	4
ES LIBERATOR	5
DOROTHY	6
CAMERON.....	7
ES GENERATOR.....	8

SZEMESCIROK

ARMELIA.....	9
SZEMESCIROK TECHNOLÓGIA	10

ŐSZI KÍNÁLAT	11
--------------------	----

KAPCSOLAT	
-----------------	--

AJÁNLÁSOK

A SIKERES SZÓJATERMESZTÉSHEZ

Az időjárási anomáliáknak kitett növénytermesztésben folyamatosan szükség van az új megoldások keresésére a gazdálkodás eredményességének javítása érdekében.

A szójára, mint a vetésszerkezet diverzifikálásának lehetséges alternatívájára tekintünk évek óta. Mostanra a Dunántúl nyugati régióiban és délen, valamint Észak-Magyarországon fontos eleme lett a vetésforgónak. Az aszály sújtotta Dél-Magyarországon a kukorica és a zöldség kultúrák visszaszorulásával egyre több öntözhető területre kerülhet szója, ahol a legnagyobb szárazságban is elérhető a 3 t/ha termésátlag.

Az Isterra-nál három európai nemesítési programból származó fajtákat tesztelünk folyamatosan. Így széles genetikai bázisból van lehetőségünk kiválasztani a hazai adottságoknak legjobban megfelelő jelölteket. Ezért tudjuk idén három fajtával bővíteni a kínálatunkat. Ezek az új fajták a rövidebb tenyészidejük és jó alkalmazkodó-képességük következtében nagyobb rugalmasságot biztosíthatnak a technológiában.


Ezzel együtt fontosnak tartjuk, hogy specifikus agrotechnikai ajánlásokkal támogassuk a fajtáinknak bizalmat szavazó termelő partnereinket.

Milyen sortávolsággal és tőszámmal vessük a szójainkat?

Immár 5 éve vizsgáljuk fajtáinkat tőszámmal kombinált sortávolság kísérletekben. Most az új, korai DOROTHY fajtánk két évjáratból származó eredményeinek segítségével foglalmaztuk meg javaslatainkat.

A két év eltérő időjárása nagyon szembevető a termésátlagokban. Míg 2024-ben a kísérlet többségében jóval 4 t/ha feletti eredményeket takarítottunk be, addig a termés 2025-ben sehol nem érte el a 4 t/ha-t.


Dorothy termése tőszám és sortávolság kísérletben, 2024.



A DOROTHY korai (0), generatív típusú, sokkal kisebb zöld tömeggel rendelkezik, mint a legtöbb szója.

Ami nagyon feltűnő, hogy az intenzívebb évjáratban a gabona és dupla gabona sortávra vetett szójak termésében szinte nincs különbség. Ezzel szemben az aszályosabb 2025-ben ez már 500 kg terméstöbbletet jelentett a dupla gabona sortávra vetett Dorothy-nál.

Dorothy termése tőszám és sortávolság kísérletben, 2025.



Amennyiben a dupla gabona sortáv eredményét az 50 cm-es - kultivátorozásra is alkalmas - sortávval vetjük össze, szintén jelentős eltérést mutat a két év. 2024-ben közel 1 t/ha terméscsökkenést jelentett az 50 cm-es sortávolság. Idén a különbség mindössze 200-300 kg volt hektáronként. Ez az eltérés részben az évjárat hatásból fakad, de azt biztosan kijelenthetjük, hogy a DOROTHY esetében az 50 cm-es vagy akár a kukorica sortáv is, termésvesztéssel járt.

Jól látszik mindkét évben, hogy a 25 cm-es sortávolság volt a legkedvezőbb.

Ezekből a kísérletekből az is megállapítható, hogy a sortávolság jelentős termést befolyásoló tényező, de azon belül a tőszámoknak, így az itt alkalmazott – 450 ezer és 550 ezres - határokon belül nincs jelentős hatása a termésre. Ez igaz mindkét évjáratra.

Összefoglalva:

- A DOROTHY habitusából is következik, hogy széles sortávolságra nem ajánljuk a vetését.
- Legkedvezőbb számára a 25 cm-es, de a 12,5-cm-es gabona sortávolság is jó választás lehet.
- Az 50 cm-es sortávolságra történő vetés minden esetben terméscsökkenést okozott.
- A sortávolságnak sokkal nagyobb szerepe van, mint a tőszámnak.
- A javasolt, egyben a legnagyobb termést hozó tőszám 500-550 ezer/ha.

A szója termesztése sok odafigyelést igényel, de ne feledjük el azt a pozitív hatást, amit előveteményként jelent az utána jövő kultúráknak. A jó fajtaválasztás kombinálva a fajtára adaptált agrotechnikával sokat segít a sikeres termesztésben.

SU ADEMIRA

Új

FAJTA JELLEMZŐI

- Növekedés típusa: determinált
- Köldök színe: világos
- Éréscsoport: igen korai
- Tenyészidő: 110 – 115 nap
- Ezermagtömeg: 190 – 200 g

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Javasolt magmennyiség: 600-650 ezer mag/ha
- Javasolt sortávolság: 12,5 - 25 cm
- Javasolt vetési idő fővetésben: április 15. – május 20.
- Javasolt vetésidő másodvetésben: június közepéig

FAJTA ERŐSSÉGEI

- Rendkívül stabil szár
- Rövid ízkövek, sűrűn elhelyezkedő csokros hüvelyek
- Egyöntetűérés, korai betakarítás
- Világos köldök, élelmiszeripari felhasználásra alkalmas
- Magas fehérjetartalom

MINŐSÉGI MUTATÓK

- Fehérjetartalom: 38 - 41%
- Olajtartalom: 20 - 22%


SZÓJA IGEN KORAI (000)

Az Isterra első 000 fajtája az igen korai éréscsoportban.

Elismerése Németországban történt. Ezekben a kísérletekben 112%-kal minősítették a standard fajták szintje felett. A 2024-es Bajor állami kísérletek győztese.

Koraiságából következik, hogy áprilisi, május eleji vetéseknél augusztus végén, szeptember elején betakarítható. Az ország északi részén is sikeresen termesztendő. Az éréscsoport legelején érik, ezért takarmánykeverék, korai árpa után másodvetésben is sikeresen termesztendő. Akár június közepéig is vethető. A világos köldöke igazán nyerő választássá teszi.

● SU ADEMIRA TERMÉSE ÉS TENYÉSZIDEJE A FEJLESZTÉSI KÍSÉRLETEKBEN, 2025



ES LIBERATOR

FAJTA JELLEMZŐI

- Növekedés típusa: féldeterminált
- Éréscsoport: igen korai
- Tenyészidő: 120 nap
- Ezermagtömeg: 190 - 210 g

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Javasolt magmennyiség: 600-650 ezer mag/ha
- Javasolt sortávolság: 12,5 - 25 cm
- Javasolt vetési idő fővetésben: április 15. – május 15.
- Javasolt vetésidő másodvetésben: június közepéig

FAJTA ERŐSSÉGEI

- Rendkívül stabil szár
- Rövid nóduszok, sűrűn elhelyezkedő csokros hüvelyek
- Egyöntetűérés, korai betakarítás
- Gyomirtás során nem mutat érzékenységet a pendimetalin hatóanyagra
- Kiemelkedő fehérjehozam

MINŐSÉGI MUTATÓK

- Fehérjetartalom: 39 - 42%
- Olajtartalom: 20 - 22%


SZÓJA IGEN KORAI (00)

Az igen korai éréscsoport (00) 2020-ban elismert kiemelkedő fajtája. Koraiságából következik, hogy desszikálás nélkül már szeptember első napjaiban betakarítható. Az ország északi részén is sikeresen termesztendő. Az éréscsoport elején érik, ezért takarmánykeverék, korai árpa után másodvetésben is sikeresen termesztendő. Fővetésben üzemi körülmények között is 4 t/ha feletti termésre képes. 2023-2024-ben több termőhelyen 4,2-4,7 t/ha termést adott nagyüzemi körülmények között is.


Az idei évben az ország különböző területein egyaránt kiválóan teljesített. A Nyugat-Dunántúlon termése elérte a 3,7 t/ha-t, míg Borsodban és Békés megyében az aszály ellenére is 3 t/ha felett termett.

Évek óta teszteljük vetésidő és tőszám kísérletekben, ami alapján a sűrű soros vetését (12-24 cm) és minimum 600 ezer mag/ha vetőmag mennyiséget javasolunk annak ellenére, hogy 2025-ben az 50 cm-es sortávnál is nagyon jól teljesített.

● ES LIBERATOR TERMÉSE ELTÉRŐ TŐSZÁMON ÉS SORTÁVOLSÁGON, 2025



● ES LIBERATOR NÉHÁNY ÜZEMI TERMÉSEREDMÉNYE, 2025



DOROTHY

Új

FAJTA JELLEMZŐI

- Növekedés típusa: féldeterminált
- Éréscsoport: korai
- Tenyészidő: 125 - 130 nap
- Ezermagtömeg: 170 - 190 g

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Javasolt magmennyiség: 500 – 550 ezer mag/ha
- Javasolt sortávolság: 12,5 - 25 cm
- Javasolt vetéside: április 15. – május 10.

FAJTA ERŐSSÉGEI

- Közepes magasság és kiváló állóképesség jellemzi
- Korán betakarítható
- Kiváló szárazságtűrés jellemzi
- Kiváló kipergés-ellenállóság

MINŐSÉGI MUTATÓK

- Fehérjetartalom: 37 – 39 %
- Olajtartalom: 21 – 22 %

SZÓJA KORAI (0)

2023-ban elismert fajta. Minősítésekor termése 10%-kal haladta meg a standard fajták szintjét.

Korai, jól elágazó fajta. Közepes magasságú, féldeterminált szója. Megdőlésre nem hajlamos. Köldök színe barna. Érés-kor a levélvesztése gyors, korán betakarítható.


Az alsó hüvely magassága átlagos. Kiváló stressztűréssel rendelkezik. A szárazságot az átlagnál jobban tolerálja.

A terméspotenciálja 4,5-5 t/ha. A 2024. évi Magyar Szója kísérleteiben több helyen is kiváló eredménnyel zárt.


Az elmúlt évek kisparcellás kísérleteiben évjáráttól függetlenül rendre az élen végzett. A Dorothy alacsonyabb és magasabb termés szinten is több, mint 10% terméslőnnyel rendelkezik a régebbi Radiosa-val szemben.

A több éves agrotechnikai kísérletek alapján vetését hektáronként minimum 500 ezer maggal javasoljuk. Elágazó fajta, ennek ellenére nem javasolt a 45 cm-nél szélesebb sortávolság.

● DOROTHY TERMÉSE KÉT ÉV FEJLESZTÉSI KÍSÉRLETÉBEN



● DOROTHY TERMÉSE 2 ÉV ÁTLAGÁBAN TŐSZÁM ÉS SORTÁVOLSÁG KÍSÉRLETEKBEN, 2024-2025



CAMERON

Új

FAJTA JELLEMZŐI

- Növekedés típusa: féldeterminált
- Éréscsoport: korai
- Tenyészidő: 128 - 130 nap
- Ezermagtömeg: 170 - 190 g

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Javasolt magmennyiség: 500-550 ezer mag/ha
- Javasolt sortávolság: 12,5 - 25 - 45 cm
- Javasolt vetésidő: április 15. – május 5.

FAJTA ERŐSSÉGEI

- Közepes magasság és kiváló állóképesség jellemzi
- Sok oldalhajtást fejleszt
- Az alsó hüvelyek magasan helyezkednek el
- Kipergés-ellenállósága kiváló

MINŐSÉGI MUTATÓK


- Fehérjetartalom: 36 - 38%
- Olajtartalom: 21 - 22%

SZÓJA KORAI (0)


2024-ban elismert, kiemelkedő termőképességgel rendelkező korai szója. A hazai kísérletekben 2 éve vizsgáljuk. A tenyészideje ideális, a korai csoport közepén érik. Termése vetekszik a középérésű szójákéval, de jóval korábban, szeptember második felében betakarítható fajta. Könnyen és veszteségmentesen vágható, mert az alsó hüvelyek magasan helyezkednek el. Köldök színe világosbarna.

A 2025. évi agrotechnikai kísérletben már a Cameront is teszteltük. A legnagyobb termést egyértelműen a 25 cm-es sortávnál érte el, az eltérő tőszámok hatása nem mutatott szignifikáns eltérést.

● CAMERON TERMÉSE AZ ISTERRA FEJLESZTÉSI KÍSÉRLETEIBEN, 2025



● CAMERON TERMÉSE A TŐSZÁM ÉS SORTÁVOLSÁG KÍSÉRLETBEN, BÓLY 2025.



ES GENERATOR

FAJTA JELLEMZŐI

- Növekedés típusa: indeterminált
- Éréscsoport: középérésű
- Tenyészidő: 135 – 140 nap
- Ezermagtömeg: 190 – 220 g

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Javasolt vetőmag mennyiség: 450– 500 ezer mag/ha
- Javasolt sortáv: 25 - 45 cm
- Javasolt vetési idő: április 10. – április 30.

FAJTA ERŐSSÉGEI

- Kiemelkedő, akár 5 t/ha feletti üzemi eredményre képes
- Gyors kezdeti fejlődésű
- Az alsó hüvelyek a talajtól átlagosan 15 cm-re helyezkednek el
- Sok erőteljes oldalhajtást fejleszt
- Kimagasló fehérjetartalom
- Nagyon magas ezermagtömeg jellemzi

MINŐSÉGI MUTATÓK


- Fehérjetartalom: 40 – 42%
- Olajtartalom: 20 - 21%

SZÓJA KÖZÉPÉRÉSŰ (1)


A középérésű csoport egyik kimagasló termőképességű fajtája. 2021-ben kapott állami elismerést hazánkban. A NÉBIH kísérleteiben a termése 4,7 t/ha, a standard fajtákat több, mint 9%-kal előzve meg. Fehérjetermése 110% az elmúlt két év eredményei alapján. Az intenzív körülményeket nagy terméssel hálálja meg. Az ország középső és déli területén javasoljuk vetését. 2022-ben a legtöbb helyen az első helyen végzett, termése aszályos körülmények között is átlag feletti. A NÉBIH 2023. évi kísérletében a középérésű csoport legnagyobb termőképességű fajtája lett. A Generator a NÉBIH standard fajtája immár 4 éve.

2025-ben kihasználva kiváló aszálytűrését azon kevés szója közé tartozott, amivel 3,5-4 t/ha termést is el lehetett érni. A déli országrész stabil, kiemelkedő fajtája. A Magyar Szója kísérletek idei abszolút győztese.

● ES GENERATOR TERMÉSE A MAGYAR SZÓJA KÍSÉRLETEIBEN



● ES GENERATOR NÉHÁNY ÜZEMI TERMÉSEREDMÉNYE, 2025



ARMELIA

FAJTA JELLEMZŐI

- Középérésű, világos vörös színű, szemes cirok
- Terméspotenciál: 9-12t/ha
- 110-120 cm a növénymagasság
- Tannin tartalom nagyon alacsony (<0,14% sz.a.)

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Ajánlott sortávolság: 25-75 cm
- Ajánlott vetőmag mennyiség: 260-300 ezer mag/ha
- Javasolt vetéside: április 20.- május 15.
- A későbbi vetés nem ajánlott

FAJTA ERŐSSÉGEI

- Kiemelkedő termőképesség és stressztűrés
- Gyors kezdeti fejlődés
- Bugája sterilításra, pergésre nem hajlamos
- Kiváló szárszilárdság, könnyű betakaríthatóság
- Átlag feletti Fusarium és Makrofomina tolerancia

SZEMESCIROK



KÖZÉPÉRÉSŰ

Új, kiemelkedő termőképességű szemes-cirok hibrid. A Boreas méltó utódja lehet.

Mind termésben, mind stressztűrésben felülmúlja elődjét. Intenzív körülmények között akár 10-12 t/ha termésre is képes.


Május közepéig vetve biztonságosan betakarítható. A sikeres termesztéshez 90-100 kg/ha N hatóanyag szükséges, ami lényegesen alacsonyabb, mint a kukoricáé.

Az alacsonyabb nitrogén igény ellenére a termés fehérjetartalma magasabb a kukoricáénál, ami alacsony tannin tartalommal együtt nagyon jó takarmányértéket jelent.


A kukoricában gyakori problémát okozó DON toxin előfordulását a hibridben idáig nem tapasztaltuk.

A 2025-ös év nagyon aszályos viszonyai között is átlag felett teljesített. Termése stabilan magasabb volt a versenytársak eredményénél.

ARMELIA TERMÉSE 2024-BEN 14 HELY ÁTLAGÁBAN



ARMELIA TERMÉSE ÉS FEHÉRJETARTALMA AZ IKR KÍSÉRLETEIBEN, 2025-BEN, 3 HELY ÁTLAGÁBAN



(Forrás: IKR nagyüzemi kísérletek adatai. Az összehasonlításban azok a hibridek szerepelnek, amelyeknek mindhárom helyről van terméseredménye.)

SZEMESCIROK

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

TALAJIGÉNY

A cirokfélék egyik előnye, hogy a gyengébb adottságú, aszályra, stresszre hajlamos területeken is sikerrel termesztethetők: ott, ahol a hagyományos szántóföldi növények már nem.

TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

A cirok tápanyag igénye némileg alacsonyabb, mint a kukoricáé, azonban a megfelelő mennyiségű és minőségű termés eléréséhez a szükséges tápanyagot biztosítani kell.

A hazai kísérleti és termelői tapasztalatok alapján a szükséges hatóanyag mennyisége: nitrogén: 80-100 kg/ha, foszfor: 60-70 kg/ha, kálium: 70-90 kg/ha. Általában ősszel juttatjuk ki a P és K teljes mennyiségét és a N 20-30%-át.

A fennmaradó N-t megosztva vetés előtt vagy vetéssel egy menetben, illetve amennyiben lehetőség van rá a cirok 6-8 leveles állapotában kell kijuttatni, mivel ebben a fenológiai fázisban kiemelkedően jól reagál a növény a nitrogénre.

A mezoelemek közül a kén szerepe lényeges, mivel a vizsgálatok szerint növeli a szemtermés fehérjetartalmát.

TALAJELŐKÉSZÍTÉS

Az apró magvú cirok esetében fontos az egyenletes, aprómorzsás, sima felszínű vetőágy, hiszen csak az ilyen felszínen kiegyenlítették a fény-, hő- és levegőviszonyok, aminek homogén csí-

rázás, a későbbiekben pedig egyenletes növényfejlődés lesz az eredménye.

VETÉS

A cirok melegigényes növény, ezért a vetést akkor érdemes megkezdeni, amikor a talajhőmérséklet tartósan eléri vagy meghaladja a 11-13 °C-ot. Szemenként javasolt a vetése, amihez a vetőtárca ajánlott lyukmérete: 1,8-2 mm.

Az optimális kivetett tőszám szemes cirok esetében gyengébb adottságú területeken 250.000; jobb termőhelyi körülmények, intenzív technológia esetében 300.000 szem/ha.

A javasolt sortáv attól függ, hogy milyen sortávolságú vetést tudunk kultivátorozni, ami a növényápolás javasolt eleme. Az optimális sortávolság a térálás tekintetében 45 cm. Ebben az esetben a betakarítás csak gabonaasztallal történhet. A gyakoribb megoldás a 76 cm-es sortávolságra való vetés, ahol a sorköz kultivátorozás szintén megoldható.

NÖVÉNYVÉDELEM

A cirok egyszikű növény és ebből következően az egyszikű gyomok elleni védekezés speciális megoldást kíván, amely már a vetőmag csávázással kezdődik.

Ezért a szokásos gombaölőszerek hatóanyag mellett, kizárólag Concep C FS® antidótummal csávázott vetőmagot kínálunk, ami megóvjaa a kultúrnövényt a

magról kelő egyszikűek ellen használható S-metolaklór hatóanyaggal szemben.

Az évelő egyszikű fenyércirok ellen jelenleg szakmailag alátámasztott, biztos gyomirtási lehetőség nincs! Egyedüli és költséghatékony megoldásként az előveteményben, vagy az őszi tarlón végzett kezeléssel lehet védekezni ellene. Emiatt évelő fenyércirokkal fertőzött területeken nem javasolt a cirok termesztése!

Gyomirtás: a technológia alapgyomirtásból (vetéstől a cirok 3 leveles koráig) és szükség esetén egy kiegészítő kétszikű gyomnövények elleni posztemergens gyomirtásból áll (a cirok 3-6 leveles állapotában).

A magról kelő és évelő kétszikű gyomok ellen kizárólag a cirok 3-6 levél közötti állapotában lehet védekezni.

A javasolt hormonhatású szerek esetében a késői kijuttatás termésvesztéssel járhat, mivel termékenyülési problémákat, akár sterilitást is okozhat! Kiemelkedően fontos a kétszikűek elleni posztemergens védekezés, mert a gyomosodás okozta termés kiesés mellett a csattanó maszlag a termésben nem elfogadott, mivel mérgező, valamint a mag átmérője megegyezik a cirokéval, így nehezen távolítható el a tételtől.

Fungicides kezelést nem igényel, gombás megbetegedésre nem hajlamos. Kártevők jellemzően nem károsítják. Az évjárat függvényében esetleg megjelenő kártevők (levéltetű, elvétel gyapottok-bagolylepke hernyó) elleni védekezésben az eseti engedéllyel rendelkező rovarölőszerek megfelelő megoldást nyújtanak.

(Részletes növényvédelmi technológia a honlapunkon megtalálható!)

NÖVÉNYÁPOLÁS

A cirok termesztésének kifejezetten javasolt eleme a sorköz művelése kultivátorral. A kísérletek egyértelműen igazolják, hogy hatására a növény fejlődése felgyorsul, kondíciója jobb lesz. Célja tehát alapvetően nem a gyomok irtása, hanem a cirok fejlődéséhez kedvező talajállapot kialakítása.

BETAKARÍTÁS

A szemes cirok zöld száron érő növény. A betakarítási akkor kezdhető, amikor a szemek kombájnbán mért nedvességtartalma 16,5-17%. Ez az időszak a napraforgó betakarítása után, az időjárás függvényében általában szeptember második dekádjára esik. A betakarítást 8-10 cm-rel a buga alatt végezzük, nem kell a teljes növényt kombájnnal betakarítani. A szemtermést 14%-os nedvességtartalom alatt tároljuk be.

ŐSZI KALÁSZOSOK



- ŐSZI BÚZA
- DURUMBÚZA
- TRITIKÁLÉ
- ŐSZI ÁRPA

ŐSZI BORSÓ



- RUCK 
- ESCRIME
- JUMPER
- UPPERCUT

**PERCZEL PÉTER**

Cégvezető

Tel.: +36 30 993 6542

E-mail: peter.perczel@isterra-seeds.com

VIRÁGNÉ PINTÉR GABRIELLA

Kereskedelmi vezető

Tel: + 36 70 513 7522

E-mail: gabi.viragne@isterra-seeds.com

MÓRO CZ PÉTER

Termékfejlesztési vezető

Tel.: + 36 30 204 5276

E-mail: peter.morocz@isterra-seeds.com

SCHMIDTNÉ AMBRUS ÁGNES

Területi képviselő – Dél-Dunántúl

Tel: +36 70 664 9275

E-mail: agnes.ambrus@isterra-seeds.com

DR. VADVÁRI LÁSZLÓ

Területi képviselő – Nyugat-Magyarország

Tel: +36 30 636 6434

E-mail: laszlo.vadvari@isterra-seeds.com

ISTERRA KÖZÉP-EURÓPA KFT.

1013 Budapest, Pauler utca 11.

www.isterra-seeds.com

 Isterra Kft.**BÁCSI JÁNOS**

Területi képviselő – Tiszántúl

Tel: +36 70 320 9191

E-mail: janos.bacsi@isterra-seeds.com

CSATORDAI LAJOS

Területi képviselő – Duna-Tisza köze

Tel: +36 70 942 2713

E-mail: lajos.csatordai@isterra-seeds.com

BUKOR SZILVIA

Asszisztens

Tel: +36 30 237 2124

E-mail: szilvia.bukor@isterra-seeds.com

NYITRAINÉ BIRÓ ILDIKÓ

Asszisztens

Tel: + 36 70 515 4007

E-mail: ildiko.biro@isterra-seeds.com

